ARTERIAL GIPERTENZIYA TERAPIYASINING QIYOSIY SAMARADORLIGI

Abduraxmonov Shoxjahon Ikromjon o'g'li
Andijon Davlat Tibbiyot Instituti ,, Davolash ishi " fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: Mamatov Baxtiyor Yusupovich
Anesteziologiya-reanimatologiya va tez tibbiy yordam yordam kafedrasi
dotsenti, davolash fakulteti dekani

Dolarbligi: Hozirgi vaqtda antigipertenziv dorilarning eng ko'p ishlatiladigan mos kombinatsiyalaridan biri bu angiotenzin ingibitorlari transformatsion ferment (va APF) va tiazid diuretikning kombinatsiyasi bo'lib, bu ularning ta'sir qilish mexanizmlari va har bir alohida komponentning ta'sirini kuchaytirish bilan bog'liq.

Tadqiqot maqsadlari: Tadqiqotning maqsadi dorilar bilan taqqoslaganda Perindopril 4mg + indapamid 1,25 mg kombinatsiyalangan preparatining samaradorligini qiyosiy o'rganish edi.

Materiallar va usullar: Ultra med xususiy klinikasida davolangan NS va unga hamroh bo'lgan AG bilan kasallangan 40 bemor tekshirildi. Tekshirilgan kasal erkaklar orasida24, ayollar 16 edi. Bemorlarning 40-65 yosh atrofidagilari olindi . Tekshirilgan barcha kunlarning kasallik muddati 1-5 yil edi. Barcha bemorlar umumiy klinik tekshiruvlar, qonning lipid spektrini o'rganish va koagulogrammalar o'tkazdilar. EKG 12 ta standart qo'rg'oshinda qayd etilgan. Gemodinamika ko'rsatkichlari ExoKG ma'lumotlariga ko'ra o'rganilgan. Bemorlar tashxis, yosh va jinsga o'xshash 2 guruhga bo'lingan: 20 bemorning I guruhi standart terapiya (antianginal, antiplatelet, antikoagulyant, statinlar) va Antigipertenziv dori Perindopril /indapamid, II guruh- 10 kun davomida kuniga 1 tabletkadan standart terapiya va enalapril/Gidroxlorotiyazid olgan, so'ngra ambulatoriya tavsiyasi berilgan. Klinika shifokori nazorati ostida qabul qilindi .

Olingan natijalar: Qabul paytida tekshirilgan barcha bemorlarda yurak mintaqasida angina og'rig'i bo'lgan. Qon bosimi (BP) kuniga 3 marta o'lchandi: ertalab,tushdan keyin va kechqurun. I darajali AG bo'lgan bemorlarning I guruhida - 7, II - 8, III darajali - 5 bemorda, II darajali AG guruhida - 8, II - 7, III sepeni-5 bemorda. Qabul paytida tekshirilgan bemorlarda EKG ma'lumotlarini o'rganish barcha bemorlarda ST segmentining 2-Zmm depressiyasini, 23 - da salbiy t - tishini, 17-bemorda yuqori uchli t-tishini aniqladi. Ekokgda bemorlarning I guruhidagi ejeksiyon fraktsiyasi (FV) 52,1 ± 4,9%, II guruhda - 45 ± 6,2%. Davolanishdan so'ng angina og'rig'i birinchi kuni 18 bemorda, davolanishning ikkinchi kunida 22 bemorda butunlay yo'qoldi. Perindopril / indapamid bilan davolangan AG I darajali bemorlarning I guruhida qon bosimi davolanishning birinchi kunida normallashdi, AG 11-111 darajali bemorlarda qon bosimi 2-3 kunlik davolanishga kamaydi. Enalapril / Gidroxlorotiyazid bilan davolangan I darajali AG bilan og'rigan bemorlar guruhida qon bosimi kasallikning ikkinchi kunida normallashdi, 11-111 darajali AG bilan og'rigan bemorlarda qon bosimi 3-5 kunlik davolanish bilan kamaydi. Davolash kompleksiga yanada chidamli AG bo'lgan ikkita bemorga kaltsiy antagonistlari, lozap buyurildi, shundan so'ng qon bosimi normallashdi.

Xulosalar: Bizning tadqiqotlarimiz natijalari Perindopril/indapamid bilan davolangan bemorlarda tezroq klinik yaxshilanish va qon bosimining pasayishini ko'rsatdi. Enalapril/Gidroxlorotiyazid bilan davolangan bemorlarda qon bosimining normallashishi keyinroq sodir bo'ldi. Shunga qaramay, aniqlangan antigipertenziv kombinatsiyalar NS bilan birga keladigan NS ni jalb qilishning samarali dorilaridir.