Volume 2, Issue 2,2024

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКА И ПРИЧИНЫ ВЫПАДИНЕ МАТКИ У КОРОВЫ

Туракулов А.Ш.
Носиров А.Х.
Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация: В данной тезисе приведены сведения о выпадении матки в послеродовом периоде, его причинах и мерах профилактики, а также у каких животных заболевание встречается чаще, какие методы и препараты применяются для лечения и профилактики.
Ключевые слова: Послеродовой период, матка, матка, мясцо, шейка матки, стенка матки, слизистая оболочка матки, кровеносные сосуды, прикрепление матки, промывание и перевязка.

Актуальность темы

В целях ускоренного развития животноводческой отрасли в республике, внедрения современных и инновационных методов, увеличения объемов и расширения ассортимента продукции, а также бесперебойного обеспечения населения качественной и доступной животноводческой продукцией местного производства и государственной поддержки предприятий, специализирующихся на животноводстве, президентом нашей республики в постановлении от 29 января 2020 года № PQ4576. В соответствии с ним даны рекомендации по обеспечению сотрудничества с гражданами, занимающимися животноводством, ведению и решению проблем развития всех отраслей животноводства и селекционной отрасли, повышению продуктивности, производству кормовых культур, внедрению новых результатов научных исследований и инновационных разработок в селекционную практику производства продукции и селекционной селекции. Кроме того, указаны проекты по строительству животноводческих, птицеводческих, рыбоводческих и кролиководческих комплексов, закупке племенного скота крупного и мелкого рогатого скота, производству и переработке продукции животноводства за счет средств Госфонда.

В последние годы в целях развития животноводства на основе научных достижений и передового опыта большое внимание уделяется племенной работе, укреплению кормовой базы, совершенствованию технологий производства и переработки продукции. Важно улучшать породу крупного рогатого скота, обогащать и сохранять генофонд. Именно поэтому в последние годы из-за границы в разные регионы нашей страны были завезены такие породы, как черная ола, голистин, симментальская, швитис и красная пустынная, резко отличающиеся от других пород хозяйственно-полезными признаками, характерными для мирового генофонда. страна. В районе строятся современные фермы по разведению крупного рогатого скота. Среди коров регистрируется множество заболеваний. Среди них у коров наблюдаются такие заболевания, как выпадение матки. В результате таких заболеваний у животных наблюдается снижение продуктивности, бесплодие, учащаются различные виды заболеваний матки, в результате чего у животных возникает выпадение матки при гинекологических заболеваниях, задержка плаценты, субинволюция матки, послеродовые парезы, послеродовые инфекции. Оказалось, что часто отмечается воспаление матки. У продуктивных коров, привезенных в хозяйства из-за границы, и среди коров среди населения, вследствие заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена витаминов и минеральных веществ, таких как остеодистрофия, гипокупроз, гипокобальтоз, алиментарная анемия, зоб, болезнь выпадения матки. В них фиксируется рост потребления продуктов питания, продуктивности и поголовья скота из-за снижения пищевой ценности их продукции, а также бесплодия матерей, хозяйства несут большие экономические потери.

Volume 2, Issue 2,2024

Выпадение матки. (Выпадение матки, инверсия матки). Данное состояние возникает после родов и проявляется в двух формах: выпячивание рога матки в полость влагалища (выпадение) и полное выпячивание матки из половых путей (полное выпадение). Заболевание чаще встречается у коров и коз, иногда у свиней и поросят. Извержение матки происходит в течение 6 часов после родов, до того, как матка сократилась, то есть когда канал шейки матки открыт достаточно для размещения тела или рога матки. При преждевременном выходе матки животное становится беспокойным и часто крепнет, сокращаются мышцы брюшного пресса, животное выгибает спину и поднимает хвост. Некоторые животные испытывают слабость, потерю аппетита и жвачку.

Нисходящая матка свиней имеет вид длинной кишки. Видно, что на слизистой оболочке имеется множество поперечных складок. Выпавшая матка мягкая, относительно мягкая, светло-красного цвета. Он твердый и темно-красного цвета из-за застоя крови и отека. Через несколько часов поверхность перевернутой матки становится сухой, покрывается трещинами и приобретает темно-серый или коричневый цвет. В дальнейшем возможно развитие некроза и сепсиса.

Уход. Животное часто лежит, поэтому под перевернутую матку подкладывают ткань или простыню и проводят эпидуральную анестезию в области крупа, в нескольких местах матки на глубину 0,5-1 см (60 ТБ для коров, 60 ТБ для коров). мелким животным (в количестве 5-20 ТБ) вводят окситоцин, промывают наждачным камнем (3%), растворами марганцовки (1:5000), фурациллина (1:5000), накладывают швы на раны матки, трещины или расчесанные участки, а также всю матку, на слизистую оболочку наносят мазь Вишневского или наносят другую противомикробную мазь. Через 5 минут после инъекции окситоцина матка сокращается на 30%, становится твердой и слегка распрямляется. Если перевернутая матка сильно набухла, ее туго перевязывают стерилизованными бинтами, смоченными 3% едким камнем или 2% раствором ваготила. Перевязку начинают от ввернутых рогов матки и направляют к половым губам. Перед расправлением матки и постановкой ее на место часть бинта раскрывают, придерживая матку обеими руками, часть, примыкающую к половым губам, приподнимают и постепенно направляют в полость таза. Затем захватывают другую часть, развязывают повязку и медленно направляют ее в полость таза. Ассистент должен придерживать матку на уровне половых губ чистой простыней.

Краткое содержание:

1. Анализ приведенных данных показывает, что для предотвращения причин выпадения матки коров рекомендуется обеспечивать постоянное спаривание с 7-го месяца пролива и распространять его на расстояние (2-3) км. в день.
2. Коров, родивших вовремя, выявляют, промывают растворами едкого камня (3%), марганцовки (1:5000), фурациллина (1:5000), накладывают швы на раны матки, места трещин или царапин, и мазь Вишневского наносят на всю слизистую оболочку матки или мазь против других микроорганизмов. Рекомендуется наложить повязку на матку.