Volume 2, Issue 2,2024

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ОРГАНОВ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РАКОМ ТЕЛА МАТКИ

***Полатова Д.Ш.*[1]**

1Ташкентский государственный стоматологический институт, Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии

***Артикходжаева Г.Ш.*[2]**

2Ташкентский государственный стоматологический институт, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Цель.
Изучение микробиоценоза органов гениталий у женщин раком тела матки.

Материалы и методы
Было исследовано 161 больных с подтвержденным диагнозом рака тела матки, проходивших лечение в условиях РСНПМЦОиР.
у больных с раком тела матки мы исследовали вагинальные выделения на чистоту мазка, проводили микроскопию и микробиологические исследований не только мазка, но и образцы тканей. Изучали микробиоценоз, также определяли гормонов и их метаболитов и связывающего стероид глобулина в тканях опухоли и тканях матки.

Результаты
При раке тела матки в отличие от рака шейки мазок из выделений был более чистым. У всех больных лечения начиналось от выполнения хирургического лечения. Если патологические мазки встречались до операции у каждой трети больных, предоперационная санация и послеоперационная антибактериальная терапия привело снижению количества патологических мазков до 8,9%. Согласно по принятому протоколу лечения больных раком шейки матки больным плохими прогностическими факторами проводят послеоперационное лучевое или химиотерапию. Так, среди больных с плохим прогнозом количество патологических мазков составлял 26,9%, проведенное же лечение привело еще большему ухудшению состояния мазка, увеличив количество патологических мазков до 50%.

Заключение
Предоперационная санация и послеоперационная антибактериальная терапия недостаточно для полной санации органов гениталий у женщин с раком тела матки. Причиной этого является не достаточное продолжительность и не правильный подбор антибактериальных средств. В некоторых случаях колонии микроорганизмов после лечения остались не изменёнными или уменьшились не значительно. В случае с Candida albicans, антибактериальное лечение привело увеличению содержания данного микроорганизма в среде.
Таким образом, у больных с раком тела матки, как и при шейки матки в основном имелась высокие татры вирусов 16 и 18 типа, при этом опасный (высокий) титр HPV-16 выявлялась каждой третей, 18 типом 28,9%.